

QUE FAIRE AU JARDIN EN JUIN ?

Les arbres, arbustes et arbrisseaux

Taillez les arbustes à floraison printanière (hauteur autour de 2 m) qui ont défléuri.

Avant de sortir le sécateur, vérifiez bien l'absence de nid. Si oui, attendez début août.

Ces arbustes peuvent aussi être conduits en haie taillée, mais d'année en années leur floraison sera moins intense et leurs pieds vont se dégarnir.

Dans ce cas, effectuez 2 à 3 tailles comme pour les arbustes à feuilles.

Ne faites rien pour les arbustes à floraison estivale. Leur taille sera prévue d'octobre 2021 à mars 2022.

- Taillez en hauteur et largeur les arbustes à feuilles (troène...) ou les conifères (thuya...) des haies taillées. Cette intervention est faite 3 fois par an.

- Valorisez les déchets de tailles. Ils sont broyés au broyeur, déchiquetés à la tondeuse thermique ou coupés en tronçons à la cisaille ou au sécateur bien affuté. Ils servent de paillis nourriciers et protecteurs. Les déchets de conifères sont autorisés à 20% (même les thuyas). Les balayures de pétales de fleurs ou des premières feuilles mortes sont valorisées en paillis.

Infos du mois : la taille des arbustes

Le kolkwitzia

Quand l'arbuste est jeune, coupez les branches les plus âgées de façon à favoriser l'émission des rejets. Après plusieurs années et comme les branches arquées vont générer des pousses florifères, taillez le bois juste au-dessus des rameaux vigoureux.



Viorne boule de neige

Conduit en buisson, taillez cet arbuste régulièrement chaque année à la manière d'un forsythia (voir fiche "A faire au jardin en Mai).



Spirée de printemps

Ne taillez pas en boule cet arbuste à floraison blanche et ne raccourcissez pas ses rameaux. Conservez les branches de 1 ou 2 ans. Coupez les branches âgées, sèches ou disgracieuses.



Weigelia

Conservez les branches âgées de 1 ou 2 ans sans les raccourcir.

Toutefois, coupez à ras quelques branches parmi celles qui sont les plus âgées.



Arbres fruitiers et petits fruits

Ne faites rien au verger, si ce n'est d'éliminer les branches malades ou mortes. A partir de juillet, vous pourrez procéder à la taille en vert.


Pour les framboisiers non remontants qui produisent en juin, protégez les nouvelles pousses. Attachez les à des piquets ou les intégrez dans le palissage.



Pour les ronces, attachez leurs nouveaux rameaux très vigoureux pour ne pas les blesser lors des cueillettes ou des passages de la tondeuse.

Pour améliorer la production de l'espace de petits fruits, complétez les paillis de déchets verts du moments (tonte, broyat de taille, plantes indésirables...).

Pour les fraisiers, les paillis constitués d'aiguilles de pin ou de sapin limitent la voracité des limaces et des escargots.



Pour en savoir + sur la taille et la plantation des arbres fruitiers et des petits fruits : "[Dossier plantation et taille des arbres fruitiers et des petits fruits](#)" sur la page du Club.

Installez ou changez les bandes engluées pour piéger les fourmis éleveuses de pucerons.

Supprimez manuellement les pousses de fruitiers attaquées par l'oïdium et compostez-les.

Placez des pièges à phéromones pour piéger les carpocapses, papillons responsables des vers des fruits. En cas de forte attaque, pulvérisez de la Carpovirusine.

Lâchez les poules sous les cerisiers : elles picoreront les pupes de mouche de la cerise.

Infos du mois - Chute de la St Jean et éclaircissage

De nombreux pommiers ou poiriers perdent des fruits ; ils laissent "tomber" ceux qui sont mal fécondés.

Cette chute est normale car les arbres font leur bilan. Les fruits les plus petits chutent (voir photo). Un excès de fruits nuit à leur qualité et leur volume à venir.

A la Saint Jean, faites un éclaircissage manuel. Une seule pomme ou poire est laissée par bouquet. Cette technique ne concerne que les arbres jeunes ou de faible volume.



Les arbres fruitiers vigoureux jouent très souvent l'alternance, car le nombre de fruits de l'année influe sur celui de l'année d'après : une bonne année suit une mauvaise.


Pour les pruniers (quetsche, mirabelle, Reine-claude...), le jardinier peut aussi observer une chute naturelle des fruits en juin.

Au potager

Comme cela vous était présenté depuis plusieurs années par Eric CHARTON, nous vous proposons d'organiser votre potager en 4 grands espaces thématiques. Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique, tout en alliant le compagnonnage entre les différentes espèces cultivées.

- **L'espace "Ratatouille"** : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, piments, plantes aromatiques, ail, oignons et échalotes.
- **L'espace "Potée"** : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, choux, concombres, cornichons, crosnes et topinambours pour donner du volume.
- **L'espace "Plat gros volumes"** : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits pois nains et à rames et fèves.
- **L'espace "Soupe de courges"** : toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
- Les salades, les radis, les blettes, les betteraves de différentes couleurs ou les navets ... occupent les parties libres ou libérées des différents espaces.

Chaque année, vous déplacerez chacune de vos planches sur la planche suivante de gauche à droite : par exemple, l'espace "Plats gros volumes" prendra la place de l'espace "Ratatouille" en année N+1 etc.



Légende : Cultures en place Travaux du mois Zones en paillis

PLAN D'IMPLANTATION DU POTAGER - ERIC CHARTON

Espace "Plats gros volumes"

Buttez les petits pois ou les pois, les fèves ou les pommes de terre (2ème buttage). Les plantes indésirables arrachées sont déposées sur l'entre-rang (attention, le faire avant leur floraison).



- Semez les haricots nains qui lèvent rapidement car le sol est chaud. Vous pouvez prévoir un semis tous les 15 jours jusqu'au 15 août 2021 (50 à 60 jours entre semis et récoltes). Buttez les haricots après l'arrivée des premières vraies feuilles.

- Semez les haricots à rame. En installant plusieurs piquets de 2,50 à 3 m (tipi, épouvantail...), vous pouvez semer en poquet (5 à 10 graines).

- Pour occuper les plates -bandes vides, repiquez les salades tous les 30 cm et dans un sol bien décompacté. Semez les salades en pépinière pour un repiquage ultérieur.



TIPI POUR HARICOTS GRIMPANTS

Quelques conseils pour protéger l'espace "Plat gros volume" !

- Eliminez les pucerons noirs des fèves. Ils sont combattus avec des pulvérisations d'infusions de mélisse, de sauge ou de lavande. Ou, utilisez du savon noir (30g /litre d'eau) ou pincez simplement les feuilles atteintes.

Vérifiez, avant de traiter, qu'il n'y ait pas déjà de larves de syrphes de coccinelles mangeuses de pucerons !



LARVE DE SYRPHE - INSECTE AUXILIAIRE

- Pour prévenir l'attaque de mildiou, pulvérisez les feuilles des pommes de terre avec une décoction de prêle.

- Attention aux doryphores, adultes et larves, qui dévorent les feuilles des pommes de terre. Ramassez les adultes et détruisez leurs œufs manuellement. Il n'y a pas d'autres solutions aussi efficace !



DORYPHORE ADULTE

Espace "Ratatouille"

- Faites un léger décompactage entre les rangs d'ail, d'oignon ou d'échalote. Attention, à ne pas blesser les bulbes. Les plantes indésirables sont arrachées puis sont laissées sur place.

- Jusqu'à mi-juin, plantez les pieds de tomates. Les distances de plantation sont de 60/80 cm sur et entre les rangs. Un tuteur droit, torsadé (queue de cochon) ou un simple fil convient.

Les pieds de tomates cerises sont plantés tous les 2m le long d'un grillage haut de plus d'1m. Ils ne sont pas taillés. Toutes les pousses sont palissées sur un grillage.

Pour les autres variétés de tomates, il est possible de conduire chaque pied sur plusieurs tiges. Les premiers gourmands vigoureux (1 à 3) sont gardés puis palissés. La vigueur est ainsi contenue et le pied est moins sensible aux maladies dont le mildiou. Ensuite, les gourmands sont coupés jeunes. A partir du 1er août, tous les gourmands sont laissés pour la 2ème phase de production.

- Plantez les pieds d'aubergine, de poivron ou de piment tous les 60/80cm sur et entre les rangs, et tuteurez les. En ne taillant pas la tige principale sur le 1er ou le 2ème bourgeon axillaire (technique de plus en plus appliquée), les fruits sont plus précoces mais moins nombreux.

- Plantez les courgettes non creuses, tous les mètres sur et entre les rangs. Les semis se poursuivent en juin pour assurer un renouvellement.

- Repiquez des laitues sur et entre les rangs pour optimiser la place et couvrir le sol.



COURGETTE EN FLEURS

Quelques conseils pour protéger l'espace "Ratatouille" !

Pour prévenir l'attaque de mildiou ou d'autres maladies, pulvérisez ces légumes-fruits avec une décoction de prêle (voir recette page suivante), de préférence le matin, sur et sous les feuilles, ou d'extraits fermentés de consoude ou d'ortie (dilution à 5 %).

Ces derniers peuvent aussi être versés à l'arrosoir aux pieds des plantes (dilution à 20%).

En cas de mildiou, les feuilles attaquées sont supprimées au couteau. le couteau sera ensuite désinfecté ! Une pulvérisation de bicarbonate de soude (5 g par litre d'eau + savon noir) bloque cette maladie.

Espace "Potée"

- Repiquez les choux pommés (Cabus, de Milan, quintal, rouge...) à feuilles ou à fleurs (chou-fleur, brocoli, Romanesco) tous les 50 cm entre et sur le rang. Les différentes variétés de choux-raves (verts, rouges...) le sont tous les 30 cm.

Avant leur plantation, les plants achetés en mini-mottes sont plongés dans de l'eau pour les imbiber et faciliter ainsi une reprise rapide. En pépinière, semez toutes les variétés de choux à repiquer en pleine terre. Vous pouvez le faire aussi en godets de récupération ou sur plaques de semis.



- Semez des panais jusqu'à mi-juin. Lorsque les jeunes plants ont 3 ou 4 feuilles, éclaircissez-les, en ne laissant qu'un pied tous les 15 cm pour le semis en ligne ou à 25 cm en tous sens. Les déchets d'éclaircissage sont laissés entre les rangs.

- Semez aussi les derniers rangs de carottes. Le choix variétal peut se porter sur des carottes fourragères (jaunes du Doubs, blanches à col vert...) consommables comme des espèces potagères. L'entre-rang de carottes ou de panais est paillé de divers déchets verts.



En juin, repiquez en minimotte les céleris-raves et les céleris-branches à 30/40 cm sur et entre les rangs. Une terre enrichie en compost mûr est nécessaire car ce légume-racine est très gourmand en nutriments. Un paillage épais de plus de 5 cm est obligatoire.

- Repiquez les poireaux jusqu'à début août en fonction des variétés (Bleu de Solaize, de Carentan, Monstrueux d'Elbeuf...). Repiquez les plants de la grosseur d'un crayon. Habillez les en coupant la moitié des racines et un tiers des feuilles. Pour avoir des fûts blancs plus longs, les poireaux sont enfoncés profondément grâce à un plantoir. Plusieurs semaines après, il seront buttés et paillés.



- Semez des betteraves rouges (Crapaudine, Noire d'Egypte...) et des navets (Navet blanc...) ou repiquez des laitues. Les betteraves peuvent être semées en godets ou en plaque de semis. Ces semis ou plantation permettent d'occuper les places libres ou libérées de l'espace "Potée".


- Repiquez les concombres ou les cornichons tous les mètres dans une terre riche en matière organique. Vous pouvez encore en semer en juin directement en pleine terre. Leur palissage sur un grillage haut d'1,00m à 1,60m favorise leur développement et fait gagner de la place.

- Plantez des plantes aromatiques en godets (oseille, ciboulette, ciboule, mélisse citronnelle, sauge, thym, romarin...) et semez (derniers jours) les différentes variétés de basilic en place ou en godets.

Info du mois : la taille des concombres

Vous pouvez laisser faire sans tailler mais des tailles successives accélèrent la venue des fruits. Une fois que la tige principale porte 4 vraies feuilles, coupez après la deuxième ou troisième feuille. Taillez ensuite les deux rameaux secondaires qui se sont développés après la troisième feuille lorsqu'ils en ont 5 ou 6. Les fruits apparaissent sur les rameaux qui naissent à la base des feuilles conservées. Ensuite, raccourcissez les tiges qui les portent, une feuille au-dessus du fruit.

Attention, les cornichons ne sont pas taillés !



Quelques conseils pour protéger l'espace "Potée" !

- Comme les choux sont fortement attaqués par les limaces, prévoyez des techniques simples (cendre de bois, aiguilles de pin ou de sapin ... ou produits anti-limaces autorisés en agriculture biologique).

- Pulvériser contre les aleurodes des choux (moucheron blanc) avec des infusions de mélisse, de sauge ou de lavande. Vous pouvez aussi utiliser du savon noir (30 g / litre d'eau) ou pincer simplement les feuilles atteintes. En plantant les choux dans un paillis odorant (mélisse, sauge...), la pression des aleurodes est moins forte.

Espace "Soupe de courges"

- Repiquez les différentes espèces de courges (butternut, citrouille, longue de Nice, potimarron, potiron, spaghetti, turban turc...) en respectant les distances de plantation (de 1 à 2 m selon les variétés) et en complétant les paillis avec les déchets du moment (tontes de pelouse, broyat de déchets de taille...).



Quelques conseils pour protéger cet espace !

- Protégez les légumes-fruits des limaces en mettant un pot percé autour et dépassant du sol de 3 à 5 cm. 5 à 8 granulés d'anti-limaces autorisés en Agriculture biologique (Ferramol) sont déposés à l'intérieur.

- Comme en période très chaude, les feuilles des courges sont sensibles au blanc (oïdium), prévenez ces attaques en pulvérisant toutes les semaines et le soir avec un mélange d'eau et de lait (ou petit-lait) ou une décoction de prêle.



OÏDIUM SUR COURGE - JARDINER MALIN.FR

Astuce du mois - La merveilleuse décoction de prêle !

Connaissez-vous la prêle des champs ?

Certains diront "Oh quelle terrible mauvaise herbe !"

D'autres, au contraire, vanteront ses louanges. Outre ses vertus reminéralisantes pour lesquelles on l'utilise en phytothérapie, la prêle présente aussi de nombreux atouts pour le jardinier.

En effet, très riche en minéraux et oligo-éléments, notamment en silice, la prêle est excellente en prévention des maladies du potager.

Utilisée essentiellement en décoction et pulvérisée sur le feuillage, la silice qu'elle contient va pénétrer via les stomates des feuilles et renforcer l'épiderme de vos plantes. Celui-ci sera donc plus résistant face aux attaques de maladies, voire même de ravageurs.

Arbres, arbustes, végétaux d'ornement ou potagers, tous peuvent en bénéficier.



PRÊLE DES CHAMPS

Voici la recette de la décoction :

- Mettre 1 kg de prêle fraîche (ou 100gr de prêle sèche) à macérer dans 10l d'eau pendant 24h
- Porter à ébullition pendant 30mn
- Filtrer le mélange
- Diluer à 20% avec de l'eau de pluie
- Pulvériser sur et sous le feuillage, de préférence le matin (les stomates sont bien ouverts)